بسمه تعالی


	امتحانات نوبت اول مدرسه استعدادهای فرزانگان شهرستان خاش – دی ماه ۱۴۰۳		
سوالات ارزشیابی درس **شیمی – پایه هشتم**	تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۱۰/۱۵	مدت امتحان: ۶۰ دقیقه	مهر آموزشگاه
نام و نام خانوادگی:	شعبه کلاس:	تعداد صفحات: ۲	

تذکر: پاسخ سؤالات را با استفاده از خودکار آبی درمقابل آن بنویسید

ردیف	سؤالات	نمره
۱	«هر یک از جمله های زیر را با کلمه های مناسب داخل پرانتز کامل کنید.هر مورد ۰/۲۵ نمره» الف - حلال هوای اطراف ما گاز .....(نیتروژن – اکسیژن) می باشد. ب- اگر به آب مقطر نمک بیافزاییم عدد پی اچ آن .....(کم – بدون تغییر – زیاد) می شود. پ- برای جداسازی دو مایع ..... (امتزاج ناپذیر – امتزاج پذیر) از دستگاه تقطیر استفاده می کنیم. ت- نقطه انجماد یک ماده جز خواص ..... (شیمیایی - فیزیکی) آن ماده است. ث- زرده تخم مرغ درسس مایونز نقش ..... (عامل امولسیون کننده – اجزای امولسیون) را دارد.	۱/۲۵
۲	«صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. هر مورد ۰/۲۵ نمره » جمله | صحیح | غلط الف - وقتی pH ماده ای از ۲ به ۳ افزایش می یابدغلظت یون هیدروژن ۱۰ برابر افزایش می یابد. ☐ ☐ ب- کلوئیدها تنوع زیادی دارند که معروف ترین آن امولسیون است. ☐ ☐ پ- با روش جداسازی فیزیکی می توان اجزای ماده ترکیب را از هم جدا کرد. ☐ ☐ ت- شیر یک ماده با pH اسیدی است که در اثر حل شدن در آب یون هیدروژن آزاد می کند. ☐ ☐ ث- مواد هنگام مخلوط شدن خواص اولیه خود را از دست می دهند. ☐ ☐	۱/۲۵
۳	«گزینه درست را با علامت (×)مشخص کنید. هر مورد ۰/۲۵ نمره » ۱- کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ الف- مس ☐ ب- نمک خوراکی ☐ ج- هوا ☐ د- طلا ☐ ۲- اگر مقدار حل شونده در ۲۰۰ گرم حلالی که دارای قابلیت انحلال آن ۵۰ گرم است برابر ۸۰ گرم باشد، این محلول ..... است. الف- سیرشده ☐ ب- سیرنشده ☐ ج- فراسیر شده ☐ د- نمی توان تعیین کرد ☐ ۳- افزایش دما سبب کاهش انحلال پذیری کدام یک از موارد زیر می شود؟ الف- پتاسیم نیترات ☐ ب- شکر ☐ ج- اکسیژن ☐ د- نمک خوراکی ☐ ۴- برای جداسازی کدام مخلوط می توان از قیف جداکننده استفاده کرد؟ الف- خامه از شیر ☐ ب- آب و نمک ☐ ج- آب و خاک ☐ د- روغن و آب ☐ ۵- جوزف تامسون به وجود کدام ذره اتم پی برد؟ الف- نوترون ☐ ب- پروتون ☐ ج- الکترون ☐ د- پروتون و نوترون ☐	۱/۲۵

«ادامه در صفحه بعد»

www-kamoon-ir

۴	هر یک از عبارات داده شده را به مفاهیم مرتبط وصل کنید. **ستون الف** ● آب و خاک ● سالاد ● نمک پتاسیم نیترات در آب ● سکه ۱۰۰۰ ریالی **ستون ب** ● مخلوط همگن جامد در مایع ● مخلوط همگن جامد در جامد ● مخلوط ناهگن جامد در مایع ● مخلوط ناهمگن جامد در جامد	۱
	سوالات تشریحی	
۵	تعریف کنید: الف- انحلال پذیری: .... ب- ترکیب:	۱/۵
۶	چگونه می توان یک محلول اشباع را از محلول فوق اشباع تشخیص داد؟ (هر دو روش را بنویسید)	۱
۷	الف- حلال را تعریف کنید. (به طور کامل پاسخ دهید)(۰/۷۵) .... ب- دو حلال مهم صنعتی را بنویسید.(۰/۵)	۱/۲۵
۸	باتوجه به نمودار به سوالات زیر پاسخ دهید. (مقدار آب به عنوان حلال در همه آزمایش ها یکسان است.) الف- در محدوده ی دمایی ۴۰ تا ۶۰ درجه انحلال پذیری کدام مواد تغییر نمی کند؟ ب- افزایش دما بر انحلال پذیری کدام ماده اثر بیشتری دارد؟ پ- کدام ماده می تواند گاز باشد؟  	۱
۹	در جملات زیر اشتباهات علمی را مشخص کنید و سپس صحیح آن را بنویسید. الف- در دستگاه تقطیر دو تغییر حالت فیزیکی رخ می دهد، ابتدا در ظرف بشر تغییر حالت فیزیکی تبخیر رخ می دهد و پس از آن در ظرف مبرد (خنک کننده) تغییر حالت فیزیکی تصعید صورت می گیرد. ب- اسپری نوعی تعلیقه مایع در گاز و آلیاژ نوعی کلوئید جامد در جامد است.	۱
۱۰	اساس جداسازی مواد در دستگاه کروماتوگرافی چیست؟	۰/۵
۱۱	دو تفاوت مخلوط همگن و مخلوط ناهمگن را بنویسید.	۱
۱۲	قابلیت انحلال پذیری مادّه‌ای در آب در دمای ۴۵ درجه برابر ۶۰ و در دمای ۳۶ درجه برابر ۵۰ گرم در ۱۰۰ گرم آب می‌باشد. اگر ۱۰۰ گرم از محلول سیرشده ی این ماده را از دمای ۴۵ درجه به ۳۶ درجه برسانیم، چند گرم رسوب خواهد کرد؟	۱/۵
۱۳	در $^{27}_{13}Al$ تعداد الکترون،پروتون و نوترون را بدست آورید.	۰/۷۵
۱۴	جدول زیر را کامل کنید: 		ویژگی ماده	(تعلیقه– کلوئید– محلول)
الف	مسیر عبور نور را مشخص نمی کند.	.....
ب	اندازه ذرات آن بیش از ۱۰۰ نانومتر است.	.....
پ	حباب نمونه ای از این نوع ماده است.	.....		۰/۷۵
	موفق باشید	۱۵

www.kanoon.ir

حسین احودی رتبه ۱۱ منطقه ۲ و ۲۸ کشور کنکور تجربی ۱۴۰۴ پزشکی تهران

بسمه تعالی

امتحانات نوبت اول مدرسه استعدادهای فرزانگان شهرستان خاش – دی ماه ۱۴۰۳		
سوالات ارزشیابی درس شیمی – پایه هشتم	تاریخ امتحان: ۱۴۰۳/۱۰/۱۵	مدت امتحان: ۶۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی:	شعبه کلاس:	تعداد صفحات: ۲

تذکر: پاسخ سؤالات را با استفاده از خودکار آبی در مقابل آن بنویسید

ردیف	سؤالات	نمره
۱	«هر یک از جمله های زیر را با کلمه های مناسب داخل پرانتز کامل کنید.هر مورد ۰/۲۵ نمره» الف - حلال هوای اطراف ما گاز ..... (نیتروژن – اکسیژن) می باشد. ب- اگر به آب مقطر نمک بیافزاییم عدد پی اچ آن .....(کم – بدون تغییر – زیاد) می شود. پ- برای جداسازی دو مایع ..... (امتزاج ناپذیر – امتزاج پذیر) از دستگاه تقطیر استفاده می کنیم. ت- نقطه انجماد یک ماده جز خواص ..... (شیمیایی – فیزیکی) آن ماده است. ث- زردهتخم مرغ در بین مایونز نقش ..... (عامل امولسیون کننده – اجزای امولسیون) را دارد.	۱/۲۵
۲	«صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. هر مورد ۰/۲۵ نمره » جمله / صحیح / غلط الف - وقتی pH ماده ای از ۲ به ۳ افزایش می یابدغلظت یون هیدروژن ۱۰ برابر افزایش می یابد. ☐ ☑ ب- کلوئیدها تنوع زیادی دارند که معروف ترین آن امولسیون است. ☑ ☐ پ- با روش جداسازی فیزیکی می توان اجزای ماده ترکیب را از هم جدا کرد. ☐ ☑ ت- شیر یک ماده با pH اسیدی است که در اتر حل شدن در آب یون هیدروژن آزاد می کند. ☑ ☐ ث- مواد هنگام مخلوط شدن خواص اولیه خود را از دست می دهند. ☐ ☑	۱/۲۵
۳	«گزینه درست را با علامت (×)مشخص کنید. هر مورد ۰/۲۵ نمره » ۱- کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ الف- مس ☐ ب- نمک خوراکی ☐ ج- هوا ☒ د- طلا ☐ ۲- اگر مقدار حل شونده در ۲۰۰ گرم حلالی که دارای قابلیت انحلال آن ۵۰ گرم است برابر ۸۰ گرم باشد، این محلول ..... است. الف- سیرشده ☐ ب- سیرنشده ☒ ج- فراسیر شده ☐ د- نمی توان تعیین کرد ☐ ۳- افزایش دما سبب کاهش انحلال پذیری کدام یک از موارد زیر می شود؟ الف- پتاسیم نیترات ☐ ب- شکر ☐ ج- اکسیژن ☒ د- نمک خوراکی ☐ ۴- برای جداسازی کدام مخلوط می توان از قیف جداکننده استفاده کرد؟ الف- خامه از شیر ☐ ب- آب و نمک ☐ ج- آب و خاک ☐ د- روغن و آب ☒ ۵- جوزف تامسون با وجود کدام ذره اتم پی برد؟ الف- نوترون ☐ ب- پروتون ☐ ج- الکترون ☒ د- پروتون و نوترون ☐	۱/۲۵


«ادامه در صفحه بعد»

www.KanoonIr
Scanned with CamScanner

حسین داودی رتبه ۱۱۰ منطقه ۲۲۸۰ کشور کنکور تجربی ۱۴۰۲ پزشکی تهران

۴	هر یک از عبارات داده شده را به مفاهیم مرتبط وصل کنید. **ستون الف**: آب و خاک؛ سالاد؛ نمک پتاسیم نیترات در آب؛ سکه ۱۰۰۰ ریال **ستون ب**: مخلوط همگن جامد در مایع؛ مخلوط همگن جامد در جامد؛ مخلوط ناهمگن جامد در مایع؛ مخلوط ناهمگن جامد در جامد
۱	

سوالات تشریحی

۵	تعریف کنید: الف- انحلال پذیری: به مقدار جرم حل شونده در ۱۰۰gr حلال در دمای معین گفته می شود. ب- ترکیب: ماده ای که از بیش از یک نوع عنصر ساخته شده باشد.	۱/۵
۶	چگونه می توان یک محلول اشباع را از محلول فوق اشباع تشخیص داد؟ (هر دو روش را بنویسید) ۱- اگر به محلول فوق اشباع بلورک بیندازیم به محلول اشباع تبدیل می شود و رسوب ایجاد می شود. ۲- اگر حل شونده به محلول اضافه کنیم رسوب ایجاد نمی شود.	۱
۷	الف- حلال را تعریف کنید. (به طور کامل پاسخ دهید) (۰/۷۵) حلال ماده ای است که حالت فیزیکی خود را حفظ می کند و مقدار بیشتری از محلول را شامل می شود. ب- دو حلال مهم صنعتی را بنویسید. (۰/۵) ..... اتانول و متانول	۱/۲۵
۸	با توجه به نمودار به سوالات زیر پاسخ دهید. (مقدار آب به عنوان حلال در همه آزمایش ها یکسان است.) الف- در محدوده ی دمایی ۴۰ تا ۶۰ درجه انحلال پذیری کدام مواد تغییر نمی کند؟ B و D ب- افزایش دما بر انحلال پذیری کدام ماده اثر بیشتری دارد؟ A پ- کدام ماده می تواند گاز باشد؟ C 	۱
۹	در جملات زیر اشتباهات علمی را مشخص کنید و سپس صحیح آن را بنویسید. الف- در دستگاه تقطیر دو تغییر حالت فیزیکی رخ می دهد. ابتدا در ظرف بشر تغییر حالت فیزیکی تبخیر رخ می دهد و پس از آن در ظرف مبرد (خنک کننده) تغییر حالت فیزیکی تصعید صورت می گیرد. صحیح ب- اسبری نوشی تعلیقه مایع در گاز و آلیاژ نوشی کلوئید جامد در جامد است. محلول	۱
۱۰	اساس جداسازی مواد در دستگاه کروماتوگرافی چیست؟ اساس آن بر تفاوت مواد و تفاوت اندازه ذرات	۰/۵
۱۱	دو تفاوت مخلوط همگن و مخلوط ناهمگن را بنویسید. در همگن خواص فیزیکی در سراسر آن یکسان است اما در ناهمگن یکسان نیست در همگن مواد قابل تشخیص از هم نیستند اما در ناهمگن قابل تشخیص هستند	۱
۱۲	قابلیت انحلال پذیری ماده‌ای در آب در دمای ۴۵ درجه برابر ۶۰ و در دمای ۳۶ درجه برابر ۵۰ گرم در ۱۰۰ گرم آب می‌باشد. اگر ۱۰۰ گرم از محلول سیرشده ی این ماده را از دمای ۴۵ درجه به ۳۶ درجه برسانیم، چند گرم رسوب خواهد کرد؟ ۴۵° ⇒ ۶۰g → ۱۰۰gآب = ۱۶۰gr محلول ۳۶° ⇒ ۵۰g → ۱۵۰gr محلول ۱۶۰ → ۱۰۰ → x = ۶۲/۵gr ۱۵۰ → ۱۰۰ → y = ۴۵gr ۴۵ − ۶۲/۵ = −۱۷/۵gr ۳۶° در دمای ۴۵/۲gr = ۳۷/۵ − ۳۲/۵ = ۵gr رسوب	۱/۵
۱۳	در $^{27}_{13}Al$ تعداد الکترون، پروتون و نوترون را بدست آورید. P = ۱۳ n = ۱۴ e = ۱۳	۰/۷۵
۱۴	جدول زیر را کامل کنید: **ویژگی ماده** / **(تعلیقه- کلوئید- محلول)** الف- مسیر عبور نور را مشخص نمی کند. ..... محلول ب- اندازه ذرات آن بیش از ۱۰۰ نانومتر است. ..... تعلیقه پ- حباب نمونه ای از این نوع ماده است. ..... کلوئید	۰/۷۵
	موفق باشید	
۱۵		

Scanned with CamScanner