
نام ونام خانوادگی : پایه و رشته: دوازدهم ـ تجربی دبیر مربوطه: دکتر پروانه مهین‌فر	بسمه تعالی مدیریت آموزش و پرورش ناحیهٔ ۳ تبریز دبیرستان غیردولتی برهان (دوره دوم)	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ مدت امتحان: ۸۰ دقیقه تعداد سوالات: ۲۲ نام آزمون: زیست‌شناسی(۳)

ردیف	سوالات (پاسخ‌نامه دارد)	بارم
۱	**درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.** الف) نوکلئوتیدهای مولکول دِنا از نظر نوع قند، نوع باز آلی نیتروژن‌دار و تعداد گروه‌های فسفات با یکدیگر تفاوت دارند. ب) تغییر یک نوع آمینواسید در ساختار اول یک پروتیین، ممکن است هم ساختار و هم فعالیت آن پروتیین را تغییر دهد. ج) در همهٔ مراحل رونویسی از یک ژن جهت ساخت رِنا، تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین رشتهٔ الگوی دِنا و رِنا دیده می‌شود. د) جهت پروتیین‌سازی، تجمع رِناتَن‌ها در یاخته‌های فعال موجودات زندهٔ مورد استفاده در آزمایشات گریفیت دیده می‌شود. ه) افزایش طول عمر مولکول رِنای پیک، جهت افزایش میزان پروتیین‌های ساخته‌شده، از روش‌های تنظیم بیان ژن می‌باشد. و) برای صفات تک‌جایگاهی و دو دِگره‌ای وابسته به X نهفته، تعداد انواع ژن‌نمود و رخ‌نمود برای مردان و زنان برابر است. ز) با وقوع جهش جانشینی دگرمعنا، طول مولکول‌های دِنا، رِنای پیک و رشتهٔ پلی‌پپتیدی نسبت به حالت طبیعی تغییر می‌کند. ح) توالی‌های حفظ‌شده ممکن است مربوط به خزانهٔ ژنی گونه‌های مختلف باشدکه با کمک آن به تاریخچهٔ تغییرگونه‌ها پی می‌برند.	۲
۲	**هر یک از عبارت‌های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.** الف) در یک رشتهٔ مولکول نوکلئیک‌اسید، پیوند فسفودی‌استر بین قند یک نوکلئوتید و ..... نوکلئوتید مجاور برقرار می‌شود. ب) هر یک از چهار زنجیرهٔ پلی‌پپتیدیِ تشکیل دهندهٔ ساختار چهارم هموگلوبین، یک گروه غیرپروتیینی به نام ..... دارد. ج) به بخش‌های موجود در مولکول دِنای خطی که رونوشت آنها در رِنای پیک سیتوپلاسمی حذف می‌شود، ..... می‌گویند. د) پس از استقرار رِنای ناقل حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P رِناتَن، رِنای ناقل بدون آمینواسید در جایگاهِ ..... قرار می‌گیرد. ه) در ارتباط با گروه خونی ABO انسان، ژن‌های مربوطه دارای جایگاه ژنی یکسانی روی کرموزوم‌های شمارهٔ ..... هستند. و) با توجه به رابطهٔ اللیِ مرتبط با رنگ گل میمونی، از آمیزش گل سفید و صورتی‌رنگ، گل‌هایی با رنگ ..... ایجاد نمی‌شود. ز) علت کم‌بودن احتمال تشخیص بسیاری از جهش‌های مربوط به مولکول دِنا، عدم تأثیر فوری این جهش‌ها بر ..... می‌باشد. ح) جهت ایجاد دو گونه از یک جمعیت، باید یکی از نیروهای مؤثر بر تغییر ساختار ژنی جمعیت، یعنی ..... متوقف شود.	۲
۳	**برای کامل کردن هر یک از عبارت‌های زیر، از بین کلمات داخل پرانتز، مورد مناسب را انتخاب کنید.** الف) ویرایش به فعالیت نوکلئازی آنزیم‌دِنابسپاراز گفته می‌شود که باعث رفع اشتباه‌ها طی **(رونویسی ـ همانندسازی)** می‌شود. ب) جهت انجام فرایند همانندسازی دِنا، داشتن یک جایگاه آغاز همانندسازی، در **(اغلب ـ همهٔ)** پروکاریوت‌ها دیده می‌شود. ج) طی همانندسازی دِنای هسته‌ای، آنزیم دِنابسپاراز دخیل در این فرایند، انرژی فعال‌سازی واکنش را **(افزایش ـ کاهش)** می‌دهد. د) فرایند اتصال آمینواسید مناسب به رِنای ناقل، توسط آنزیم تشخیص‌دهندهٔ پادرَمزهٔ رِنا، **(نیازمند ـ بی‌نیاز از)** انرژی است. ه) در تنظیم بیان ژن‌های اشرشیاکلای، در پی اتصال لاکتوز به پروتیین تنظیم‌کننده، گلوکز **(بیشتری ـ کمتری)** حاصل می‌شود. و) در صفت‌چندجایگاهی مربوط به رنگ نوعی ذرت، فنوتیپAabbcc به ذرتی با ژنوتیپِ **(aabbCC - aaBBCc)**شباهت کمتری دارد. ز) با در نظر گرفتن ناهنجاری‌های مربوط به فام‌تن‌ها، جهش مضاعف‌شدگی در یاخته‌های **(تک‌لادی ـ دولادی)** مشاهده می‌شود. ح) یکسان بودن احتمال آمیزش هر فرد با افراد جنس دیگر در یک جمعیت، در **(حفظ ـ عدم حفظ)** تعادل ژنی جمعیت نقش دارد.	۲
"ادامه سوالات صفحهٔ دوم"		


www.kanoon.ir

نام ونام خانوادگی : پایه و رشته: دوازدهم ـ تجربی دبیر مربوطه: دکتر پروانه مهین‌فر	بسمه تعالی مدیریت آموزش و پرورش ناحیهٔ ۳ تبریز دبیرستان غیردولتی برهان (دوره دوم)	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ مدت امتحان: ۸۰ دقیقه تعداد سوالات: ۲۲ نام آزمون: زیست‌شناسی(۳)

ردیف	سوالات (پاسخ‌نامه دارد)	بارم
۴	**در مورد آزمایش‌های انجام گرفته برای کسب اطلاعات اولیه در مورد مادهٔ وراثتی و پی بردن به ماهیت آن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.** الف) در کدام آزمایش(های) گریفیت، از تک‌یاخته‌ای‌های بدون پوشینهٔ زنده استفاده شد؟ ب) نتیجهٔ کدام آزمایش(های) گریفیت نشان داد وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش‌ها نیست؟ ج) در کدام آزمایش(های) ایوری و همکاران او، در بیشتر محیط‌های کشت باکتری، انتقال صفت صورت نگرفت؟	۱
۵	علت آغاز همانندسازی مولکول دِنای خطی در چندین نقطه در هر فام‌تن چیست؟	۰/۷۵
۶	تعداد نوکلئوتیدهای آدنین‌دار و تیمین‌دار هر یاخته‌ای ممکن است با تعداد آنها در یاختهٔ دیگر متفاوت باشد. علت چیست؟ ذکر یک مورد کافی است.	۰/۵
۷	الف) زنجیرهٔ پلی‌پپتیدی چگونه شکل می‌گیرد؟ ب) چرا گاهی برای ساخت یک پروتیین بیش از یک ژن مورد نیاز است؟	۰/۷۵
۸	ساختار سوم اولین پروتیینی که ساختار آن شناسایی شد، با تشکیل کدام پیوندها تثبیت می‌شود؟	۰/۷۵
۹	گفته می‌شود "**تب بالا خطرناک است**"، بین این مسئله و فعالیت آنزیم‌ها چه ارتباطی می‌بینید؟	۰/۵
۱۰	**شکل زیر مرحله‌ای از فرایند ترجمه را نشان می‌دهد، با توجه به آن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.**  الف) با توجه به این شکل، تا این مرحله چند بار رِناتَن جابه‌جا شده است؟ ب) کدام شماره، عامل جدا شدن پلی‌پپتید از آخرین رِنای ناقل را نشان می‌دهد؟ ج) ضمن تشکیل پیوندهای مربوط به شمارهٔ ۴، چند مولکول آب آزاد شده است؟	۰/۷۵
	"ادامه سوالات صفحهٔ سوم"	

www-kanoon-ir

نام ونام خانوادگی : پایه و رشته: دوازدهم ـ تجربی دبیر مربوطه: دکتر پروانه مهین‌فر	بسمه تعالی مدیریت آموزش و پرورش ناحیهٔ ۳ تبریز دبیرستان غیردولتی برهان (دوره دوم)	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ مدت امتحان: ۸۰ دقیقه تعداد سوالات: ۲۲ نام آزمون: زیست‌شناسی(۳)

ردیف	سوالات (پاسخ‌نامه دارد)	بارم
۱۱	الف) تنوع محل‌های انجام فرایند ترجمه در کدام بیشتر است؟ اشرشیاکلای یا گربه؟ ب) با ذکر دو علت، نشان دهید که چرا رَمزه آمینواسیدها در جانداران یکسان‌اند.	۰/۷۵
۱۲	**شکل مقابل نوعی تنظیم بیان ژن در مرحلهٔ رونویسی را نشان می‌دهد.** الف) ماهیت شمارهٔ ۱ مربوط به کدام‌یک از مولکول‌های زیستی می‌باشد؟  ب) کدام شماره که ماهیت مشابهی با هیستون دارد، بر سرعت و مقدار رونویسی ژن مؤثر است؟ ج) این نوع تنظیم بیان ژن در چه موجوداتی دیده می‌شود؟	۰/۷۵
۱۳	الف) اتصال بعضی رِناهای کوچک مکمل به رِنای پیک، مربوط به کدام مرحله از تنظیم بیان ژن است؟ ب) به چه علت تغییر در میزان فشردگی فام‌تن، روشی برای تنظیم بیان ژن در نظر گرفته می‌شود؟	۱
۱۴	**کدام مورد یا موارد زیر به درستی بیان شده است؟ توضیح اضافی لازم نیست.** الف) زمانی که از لحاظ گروه خونی Rh، هم پدر و هم مادر دارای ژنوتیپ Dd باشند، احتمال تولد فرزندی با گروه خونی Rh^+ ناخالص بیشتر از احتمال تولد فرزندی با گروه خونی Rh^+ خالص است. ب) اگرژنوتیپ والدین با هم متفاوت بوده و ازلحاظ گروه خونی Rh خالص باشند، فقط دو نوع ژنوتیپ و یک نوع فنوتیپ درمیان فرزندان دیده خواهدشد. ج) زمانی که از لحاظ گروه خونی Rh، پدر دارای ژنوتیپ Dd و مادر دارای ژنوتیپ dd باشند، احتمال تولد فرزندی با ژنوتیپ مشابه پدر، با احتمال تولد فرزندی با ژنوتیپ مشابه مادر برابر است. د) زمانی که از لحاظ گروه خونی Rh، هم پدر و هم مادر دارای ژنوتیپ Dd باشند، احتمال تولد فرزندی دارای حداقل یک الل D، بیشتر از احتمال تولد فرزندی فاقد الل D است.	۰/۷۵
۱۵	از ازدواج مردی که همهٔ دِگره(الل)های مربوط به گروه خونی ABO او یکسان است، با زنی با گروه خونی AB، در میان فرزندان فرزندی با گروه خونی B ناخالص دیده شود، ژنوتیپ و فنوتیپ فرزندان دیگر را با کمک مربع پانت نشان دهید.	۱
"ادامه سوالات صفحهٔ چهارم"		

www.kanoon.ir

بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی :

پایه و رشته: دوازدهم ـ تجربی

دبیر مربوطه: دکتر پروانه مهین‌فر

مدیریت آموزش و پرورش ناحیهٔ ۳ تبریز

دبیرستان غیردولتی برهان (دوره دوم)

تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

مدت امتحان: ۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: ۲۲

نام آزمون: زیست‌شناسی(۳)

ردیف	سوالات (پاسخ‌نامه دارد)	بارم
۱۶	مردی مبتلا به هموفیلی قصد دارد با زنی سالم که ناقل نیست ازدواج کند؛ فرزندان حاصل این ازدواج از لحاظ بیماری هموفیلی چه ژنوتیپ(هایی) و فنوتیپ(هایی) خواهند داشت؟	۰/۷۵
۱۷	**در ستون "الف"جدول زیر، مطالبی مربوط به رنگ نوعی ذرت که علاوه بر رابطهٔ بارزنهفتگی، نوع ترکیب دگره‌ها نیز در رنگ آن مؤثر است، بیان شده است. هر یک از موارد ستون «الف» با مورد یا مواردی از ستون «ب» ارتباط منطقی دارد، آنها را پیدا کنید و در جای مشخص‌شده بنویسید. (در ستون «ب» یک مورد اضافه است.)**	۰/۵

ستون "الف"	ستون "ب"
۱) از آمیزش ذرت‌هایی با ژنوتیپ‌های AABBcc و aabbCC ذرت‌هایی با این ویژگی تولید می‌شود.	الف) آستانهٔ قرمز
۲) از آمیزش ذرت‌هایی با ژنوتیپ‌های aaBbcc و AabbCc ذرت‌هایی با این ویژگی تولید می‌شود.	ب) فراوانی بیشتر
	ج) آستانهٔ سفید

۱) ..... ۲) .....

۱۸	به چه علت گفته می‌شود که غذاهای گیاهی در پیشگیری از سرطان مؤثر هستند؟	۰/۵
۱۹	الف) در چه صورتی اثرات رانش ژن شدیدتر خواهد بود؟ ب) تأثیر انتخاب طبیعی بر تنوع ژنوتیپی و فنوتیپی یک جمعیت را به تفکیک بیان کنید. ج) یک مورد از سازوکارهای مؤثر در تداوم گوناگونی در جمعیت‌ها را بدون بیان توضیح اضافی ذکر نمائید.	۱
۲۰	منظور از سنگواره چیست؟	۰/۷۵
۲۱	الف) وقوع کدام‌یک از انواع گونه‌زایی به رخدادهای زمین‌شناختی و سدهای جغرافیایی نیاز ندارد؟ ب) علت جدا شدن خزانهٔ ژنی افراد یک گونه از یکدیگر و فراهم شدن احتمال تشکیل گونهٔ جدید چیست؟	۰/۵
۲۲	اگر علت ایجاد گامت‌های غیرطبیعی، خطای میوزی در مرحلهٔ دوم تقسیم باشد و فقط در یکی از یاخته‌های حاصل از میوز ۱ جدا نشدن کروماتیدهای خواهری اتفاق بیافتد، یاخته‌های تخم ایجاد شده از لقاح گامت‌های این تقسیم و یک گامت طبیعی چه عدد(های) کروموزومی خواهند داشت؟	۰/۷۵
	"موفق باشید" جمع نمرات	۲۰

www.kanoon.ir

نام ونام خانوادگی : پایه و رشته: دوازدهم ـ تجربی دبیر مربوطه: پروانه مهین‌فر	بسمه تعالی پاسخ‌برگ دبیرستان غیر دولتی برهان (دوره دوم) – ناحیه ۳ تبریز	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ مدت امتحان: ۸۰ دقیقه تعداد سوالات: ۲۲ نام آزمون: زیست‌شناسی(۳)

ردیف	ریزبارم سوالات	بارم
۱	**درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.** الف) **نادرست:** نوکلئوتیدها (نه نوکلئوتیدهای مولکول دِنا) از نظر نوع قند، نوع باز آلی نیتروژن‌دار و تعداد گروه‌های فسفات با یکدیگر تفاوت دارند. قند نوکلئوتیدهای دِنا (دئوکسی‌ریبونوکلئوتید) و طبق کتاب، تعداد گروه‌های فسفات آنها (یک عدد) متفاوت نیست. (۰/۲۵) (ص۴) ب) **نادرست:** تغییر یک نوع آمینواسید در ساختار اول یک پروتئین، ساختار را تغییر می‌دهد و ممکن است فعالیت آن پروتئین را تغییردهد. (۰/۲۵) (ص۱۷) ج) **درست:** (۰/۲۵) (ص۲۳ و ۲۴) د) **درست:** جهت پروتئین‌سازی، تجمع رِناتَن‌ها هم در پروکاریوت‌ها و هم یوکاریوت‌ها دیده می‌شود.(۰/۲۵) (ص۳۲) ه) **درست:** (۰/۲۵) (ص۳۳) و) **نادرست:** برای صفات تک‌جایگاهی و دو دِگره‌ای وابسته به X نهفته، مرد ناقل وجود ندارد زیرا مردان دارای یک کروموزومX هستند ولی چون زنان دو کروموزوم X دارند زن سالم ناقل هم دیده می‌شود. (۰/۲۵) (ص۴۳) ز) **نادرست:** (۰/۲۵) (ص۴۸ و ۴۹) ح) **درست:** (۰/۲۵) (ص۵۹)	۲
۲	الف) قند (۰/۲۵) (ص۷) ب) هِم (۰/۲۵) (ص۱۷) ج) اینترون (۰/۲۵) (ص۲۵) د) E (۰/۲۵) (ص۳۰) ه) ۹ (۰/۲۵) (ص۴۱) و) قرمز (۰/۲۵) (ص۴۱) ز) رخ‌نمود (۰/۲۵) (ص۵۴) ح) شارش (۰/۲۵) (ص۶۰)	۲
۳	الف) همانندسازی (۰/۲۵) (ص۱۲) ب) اغلب (۰/۲۵) (ص۱۳) ج) کاهش (۰/۲۵) (ص۱۸) د) نیازمند (۰/۲۵) (ص۲۹) ه) بیشتری (۰/۲۵) (ص۳۴) و) **aaBBCc** (۰/۲۵) (ص۴۵) ز) دولادی (۰/۲۵) (ص۵۱) ح) حفظ(۰/۲۵) (ص۵۵)	۲
۴	الف) دوم و چهارم (۰/۲۵) (ص۲) ب) سوم (۰/۲۵) (ص۳) ج) دوم (۰/۲۵) (ص۳)	۱
۵	علت این مسئله وجود **مقدار زیاد دِنا** و قرار داشتن در **چندین فام‌تن** است که هر کدام از آنها چندین برابر دِنای باکتری هستند. اگر فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در هر فام‌تن داشته باشند **مدت زمان زیادی** برای همانندسازی لازم است. (ص۱۳)	۰/۷۵
۶	وقوع جهش در دِنای یک یاخته و تأثیر روی تعداد نوکلئوتیدها یا عدم برابری تعداد میتوکندری‌های دو یاخته	۰/۵
۷	الف) وقتی تعدادی **آمینواسید** با **پیوند پپتیدی** به هم متصل شوند. (۰/۵) (ص۱۶) ب) چون ممکن است از بیش از یک رشتهٔ پلی‌پپتیدی تشکیل شده باشد. (۰/۲۵) (ص۱۶)	۰/۷۵
۸	هیدروژنی، اشتراکی و یونی (۰/۷۵) (ص۱۷)	۰/۷۵
۹	تب بالا موجب غیرفعال شدن آنزیم‌ها می‌شود که حتی ممکن است به مرگ بیانجامد.	۰/۵
۱۰	الف) ۴ (۰/۲۵) (ص۳۱) ب) ۳ (۰/۲۵) (ص۳۱) ج) ۴ (۰/۲۵) (ص۱۶ و ۳۱)	۰/۷۵
"ادامه ریزبارم سوالات در صفحهٔ دوم"		

www.kanoon.ir

نام ونام خانوادگی :

پایه و رشته: دوازدهم ـ تجربی

دبیر مربوطه: پروانه مهین‌فر

بسمه تعالی

پاسخ برگ

دبیرستان غیر دولتی برهان (دوره دوم) – ناحیه ۳ تبریز

تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

مدت امتحان: ۸۰ دقیقه

تعداد سوالات: ۲۲

نام آزمون: زیست‌شناسی(۳)

ردیف	ریزبارم سوالات	بارم
۱۱	الف) گربه (۰/۲۵) (ص۳۵) ب) همهٔ جانداران دارای نیای مشترک هستند. (۰/۲۵) سازوکار ساخت پروتئین‌ها در همهٔ جانداران یکسان است.(۰/۲۵) (ص۲۷)	۰/۷۵
۱۲	الف) نوکلئیک‌اسید (۰/۲۵) (ص۳۵) ب) ۳ (۰/۲۵) (ص۳۵) ج) یوکاریوت‌ها (۰/۲۵) (ص۳۵)	۰/۷۵
۱۳	الف) پس از رونویسی و ایجاد رِنای پیک (۰/۵) (ص۳۶) ب) دسترسی رِنابسپاراز به ژن تنظیم می‌شود. (۰/۵) (ص۳۶)	۱
۱۴	الف) **درست:** نیمی از فرزندان، دارای گروه خونی مثبت ناخالص خواهند بود درحالی که یک چهارم فرزندان دارای گروه خونی مثبت خالص خواهند بود. ب) **نادرست:** فقط زمانی که یکی از والدین DD و والد دیگر dd باشد، حالت گفته شده صدق می‌کند. فرزندان دارای ژنوتیپ Dd و گروه خونی مثبت خواهند شد؛ یعنی یک نوع ژنوتیپ و یک نوع فنوتیپ. ج) **درست:** اگر از لحاظ گروه خونی Rh، پدر دارای ژنوتیپ Dd و مادر دارای ژنوتیپ dd باشند، احتمال تولد فرزندی با ژنوتیپ مشابه پدر با احتمال تولد فرزندی با ژنوتیپ مشابه مادر برابر است؛ زیرا نیمی از فرزندان Dd و نیمی دیگر dd خواهند بود. د) **درست:** زمانی که از لحاظ گروه خونی Rh، هم پدر و هم مادر دارای ژنوتیپ Dd باشند، احتمال تولد فرزندی دارای حداقل یک الل D، بیشتر از احتمال تولد فرزندی فاقد الل D است. زیرا سه چهارم از فرزندان DD، Dd و dd و یک چهارم dd خواهند شد.	۰/۷۵
۱۵	فقط در صورتی این مرد و زن می‌توانند فرزندی با گروه خونی A داشته باشند که مرد دارای گروه خونی O باشد. نوشتن درست گامت‌ها (۰/۵) و مشخص کردن ژنوتیپ مورد نظر (۰/۵) گامت‌ها | A | B OO | AO | BO	۱
۱۶	الف) والدین : X^HX^H x X^hY فرزندان : X^HX^h + X^HY ب) پسر	۰/۷۵
۱۷	۱) ب فراوانی بیشتر (۰/۲۵) (ص۴۵) ۲) ج آستانهٔ سفید (۰/۲۵) (ص۴۵)	۰/۵
۱۸	غذاهای گیاهی که **پاداکسنده** (۰/۲۵) و **الیاف** (۰/۲۵) دارند در پیشگیری از سرطان مؤثرند. (ص۵۲)	۰/۵
۱۹	الف) هر چه اندازهٔ جمعیت کوچک‌تر باشد. (۰/۲۵) ب) تأثیر انتخاب طبیعی **تنوع ژنوتیپی را کاهش** (۰/۲۵) و **تنوع فنوتیپی یک جمعیت کاهش** (۰/۲۵) می‌دهد. (ص۵۵) ج) گوناگونی دگره‌ای در گامت‌ها، نوترکیبی و اهمیت ناخالص‌ها (ذکر یک مورد) (۰/۲۵) (ص۵۵ و ۵۶)	۱
۲۰	کل بدن یک جاندار، بقایای یک جاندار یا آثاری از جانداری که در گذشتهٔ دور زندگی می‌کرده است. (۰/۷۵) (ص۵۷)	۰/۷۵
۲۱	الف) هم‌میهنی (۰/۲۵) (ص ۶۱) ب) جدایی تولیدمثلی (۰/۲۵) (ص ۶۰)	۰/۵
۲۲	تک‌لاد، دولاد و سه لاد (۰/۷۵) (ص ۶۱)	۰/۷۵
	"موفق باشید" جمع نمرات	۲۰